

IGIENA DINTILOR



1. EFECTUAM IGIENA CAVITATII
BUCALE A BEBELUSULUI DE LA
PRIMUL DINTI IESIT
2. FOLOSIM SERVETELI BUCALE DUPA
FIECARE ALIMENTARE SOLIDA SI NU
NUMAI
3. PENTRU INCEPUT FOLOSIM UN
DEGETAR CU FIRE DIN SILICON MOI SI
SCURTE



@DOCTOR.ZAGORSCHI

PASTA DE DINȚI OBLIGATOR TREBUIE SĂ FIE FLUORATA



FLUORUL AJUTĂ LA ÎNTĂRIREA SMALTULUI DINȚILOR ȘI PREVINCE FORMAREA CARIILOR DENTARE. ESTE IMPORTANT CA CANTITATEA DE FLUOR DIN PASTA DE DINȚI PENTRU BEBELUȘI SĂ FIE ADAPTATĂ LA NEVOILE LOR SPECIFICE ȘI SĂ FIE UTILIZATĂ ÎN CANTITĂȚI ADECVATE, SUB SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR SAU A ÎNGRIJITORILOR, PENTRU A EVITA ÎNGHIȚIREA EXCESIVĂ DE FLUOR, CARE POATE PROVOCA FLUROZĂ DENTARĂ.

DE LA PRIMUL DINTE PASTA DE DINȚI NU TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOZA MAI MARE DE 1000PPM DE FLUOR.



@DOCTOR.ZAGORSCHI

PASTA DE DINȚI SPLAT 1000PPM



TIPURILE DE PASTE DE DINȚI RECOMANDATE DE STOMATOLOGI

PASTA DE DINȚI ELMEX 1000 PPM



PASTA DE DINȚI BRUSH-BABY 1000 PPM



PASTA DE DINȚI ELGYDIUM 1000PPM



PASTA DE DINȚI CURAPROX 950 PPM



@DOCTOR.ZAGORSCHI

ȘERVEȚELE BUCALE RECOMANDATE PENTRU
BEBELUȘI DUPĂ FIECARE
ALIMENTARE SOLIDĂ SAU ALĂPTARE




ȘTERGEM CU ȘERVEȚELE CAVITATEA BUCALĂ PENTRU A
NORMALIZA PH-UL SALIVEI ȘI PENTRU A NU PROVOCA ÎN
VIITOR DEMINERALIZĂRI DENTARE.



@DOCTOR.ZAGORSCHI

CANTITATE DE PASTĂ ADMISIBILĂ

CAT UN BOB DE MAZARE



PERIUȚA DE DINȚI



*TREBUIE SĂ FIE CU FIRELE NOI ȘI LA ACEIAȘI ÎNĂLȚIME TOATE.
IAR DUPĂ FIECARE RĂCEALĂ, NEAPĂRAT SCHIMBĂM PERIA*



@DOCTOR.ZAGORSCHI

